Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Argentina

Estado del cultivo de trigo en la provincia de Santa Fe

Informe mensual
Julio 2025

El presente informe resultó del monitoreo de 212 lotes de trigo distribuidos en todo el territorio provincial.

El relevamiento de los lotes se realizó entre los días 28 de julio y 6 de agosto de 2025 y estuvo a cargo de profesionales de las Agencias de Extensión Rural del Centro Regional Santa Fe del INTA.


Los datos relevados tienen que ver con aspectos vinculados al manejo y a la incidencia de factores abióticos y biológicos tales como malezas, plagas y enfermedades.

La finalidad de este informe es realizar un seguimiento periódico del estado de los cultivos, esta información no es utilizada para la declaración de emergencia agropecuaria.

Resumen

El mes de julio fue notablemente benigno en cuanto a temperaturas y precipitaciones. En toda la provincia ocurrieron menos días con heladas y las precipitaciones fueron mayores a los promedios históricos.

Mapa 1: Precipitaciones acumuladas – Julio 2025.



Fuente: Informe mensual meteorológico (https://www.argentina.gob.ar/noticias/informe-mensual-meteorologico-1)


Sobre un total de 212 lotes monitoreados (Mapa 2), se observó que el estado del cultivo de trigo en general se presentaba muy bueno en el centro y sur de la provincia y en estado bueno en el norte (Mapa 3).

En su gran mayoría, el cultivo se encontró en estado fenológico de macollaje.

La presencia de malezas se reportó sobre una baja proporción de lotes, siendo algo mayor en el norte (26% de los lotes) que en el centro y en el sur (16 y 12% respectivamente).


Se observó muy poca incidencia de plagas insectiles y de enfermedades y en menos del 3% de los lotes se reportaron efectos de adversidades abióticas, siendo en su mayoría efectos leves de heladas o sequía.

Mapa 2: Ubicación geográfica de los lotes monitoreados – Campaña 25-26.



La cantidad de lotes monitoreados en cada departamento es proporcional a la superficie de trigo promedio de los últimos 5 años.

Mapa 3: Estado del cultivo de trigo y proporción de los diferentes estados por departamento.



Región Norte (Departamentos 9 de Julio, General Obligado, San Javier y Vera)

En la región norte, sobre un total de 27 lotes de trigo, el 56% se encontraba en estado bueno, el 37% en estado muy bueno y solo un 7% en estado regular. En cuanto al estado fenológico, el 70% de los lotes se encontraba en macollaje, el 26% en crecimiento de plántula y un 4% estaba en elongación del tallo.

En el 26 % de los lotes se observaron malezas, en el 66% de los casos las especies informadas fueron Nabo (*Brassica campestris*) y Peludilla (*Gamochaeta spicata*) en intensidad leve. En el resto se reportó presencia de Bolsa de pastor (*Capsella bursa-pastoris*), Rama negra (*Coniza borariensis*) y Mastuerzo (*Coronopus didymus*).

Con respectos a plagas insectiles, se observó presencia leve del complejo de pulgones en el 11% de los lotes. No se observaron enfermedades y en un solo lote se reportaron efectos moderados de sequía.

Cabe aclarar que en el departamento 9 de Julio prevalece la condición de sequía con muy escasos registros pluviométricos (déficit de aproximadamente 200 mm anuales con respecto a la media de los últimos 5 años) por lo que se sembró muy poco trigo. Los únicos lotes sembrados se hicieron sobre rastrojo de girasol (Fuente: INTA - Agencia de Extensión Rural Tostado).

Región Centro (Departamentos San Cristóbal, San Justo, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Jerónimo, San Martín).

En el centro de la provincia, sobre 105 lotes monitoreados, el 76 % de los lotes se encontraba en estado muy bueno y el 23% en estado bueno, solo se reportó un lote como regular. Con respecto del estado fenológico, el 77% se encontraba en macollaje, el 12% en crecimiento de plántula y el restante 11 % en elongación de tallo.

En el 16% de los lotes se reportó presencia de malezas. En el 62% de los casos se trató de Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule*) y Capiquí (*Stellaria media*), ambas en intensidad leve y moderada. En el resto de los casos se observó Parietaria (*Parietaria debilis*), Mastuerzo (*Coronopus didymus*) y Rama Negra (*Coniza borariensis*) entre otras.

En el 13 % de los lotes se observaron plagas insectiles, siendo en el 79% de los casos Gorgojo del macollo del trigo (*Listronotus bonaerensis*) y en el 21% restante Complejo de pulgones. Ambas plagas en intensidad leve.

En cuanto a enfermedades, en un solo lote se observaron signos de Bacteriosis (*Xanthomonas campestris pv. undulosa*).

En 4 lotes se observaron efectos leves de heladas.

Región Sur (Departamentos Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, San Lorenzo y Rosario).

Sobre un total de 80 los lotes monitoreados, el 94% presentaba estado muy bueno y el 6% estado bueno. El 95% se encontró en estado fenológico de macollaje mientras que sólo el 5% en crecimiento de plántula.

El 100% de los lotes se encontraron libres de plagas y enfermedades, en tanto que en el 12% se encontró presencia de Capiquí (*Stellaria media*), Rama negra (*Coniza bonariensis*), Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule*) y Perejilillo (*Bowlesia incana*) en cantidad leve o baja.

El 1% de los lotes presentó daños leves por heladas.