Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Argentina

Estado de los cultivos extensivos en la provincia de Santa Fe

Cultivos de verano. Campaña 2025-2026

Informe mensual
ENERO 2026

El presente informe resultó del monitoreo de 103 lotes de girasol, 105 de maíz temprano, 70 de maíz tardío, 156 de soja de primera y 104 de soja de segunda distribuidos en el territorio provincial.

El relevamiento de los lotes se realizó entre los días 22 de enero y 5 de febrero de 2026 y estuvo a cargo de profesionales de las Agencias de Extensión Rural del Centro Regional Santa Fe del INTA.


Los datos relevados tienen que ver con aspectos vinculados al manejo y a la incidencia de factores abióticos y biológicos tales como malezas, plagas y enfermedades.

Del análisis de estos datos resultan los mapas de estado general de cada cultivo por departamento. Los gráficos que aparecen en los mismos representan la distribución de cada categoría del estado del cultivo en cada departamento.

La finalidad de este informe es realizar un seguimiento periódico del estado de los cultivos, esta información no es utilizada para la declaración de emergencia agropecuaria.


RESUMEN

Las precipitaciones acumuladas en enero de 2026 en Santa Fe fueron heterogéneas. Los mayores registros se concentraron en el centro-norte y noreste provincial, con acumulados superiores a 145 mm y en sectores puntuales por encima de 195 mm. En contraste, el sur y sudoeste de la provincia presentaron valores significativamente menores a lo normal, en general inferiores a 100 mm, evidenciando un marcado gradiente norte–sur en la distribución de las lluvias




Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/informe-mensual-meteorologico-7


Del monitoreo de más de 500 lotes de los cultivos de verano más relevantes en la provincia de Santa Fe, surge que los cultivos en general se encuentran en estado bueno y muy bueno.




En el norte de la provincia, el 100% de los lotes de girasol habían sido cosechados.

Estado de los cultivos por región:







GIRASOL

Región Norte (Departamentos 9 de Julio, General Obligado, San Javier y Vera)

La totalidad de los lotes monitoreados fueron cosechados.

Los rindes obtenidos de informantes calificados, oscilan entre 5 y 12 qq/ha en las zonas más restrictivas (Bajos sub meridionales), en las zonas intermedias entre 18 y 24 qq/ha y hasta 26 a 30 qq/ha en suelos de mejor aptitud (datos aportados por las agencias de extensión de INTA de Tostado y Garabato).

Región Centro (Departamentos Castellanos, La Capital, Las Colonias, San Cristóbal, San Jerónimo, San Justo y San Martín).

De los 40 lotes monitoreados, se encontró que un 65% había sido cosechado. Los rindes de los primeros lotes cosechados promediaron los 25 qq/ha, con mínimos de menos de 20 qq/ha en el departamento San Cristóbal y máximos de 40qq/ha en el departamento San Gerónimo.

De los restantes lotes monitoreados, el 43% se encontraba en estado muy bueno y el 57% en estado bueno. Todos en estados reproductivos entre R7 y R9.

Se reportaron malezas en el 57% de los lotes, la especies más frecuentes fueron Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense*), y Yuyo Colorado (*Amaranthus quitensis*. Otras especies observadas fueron Pie de gallina (*Eleusine indica*), Santa Lucía (*Commelina difusa*) y Rama negra, entre otras.

En el 26% de los lotes se reportaron daños por pájaros.

En el 20% de los lotes se observaron signos de las enfermedades Mancha de la hoja por septoria (*Septoria helianthi*) y Cancro del tallo (*Phomopsis helianthi*).

Región Sur (Departamentos Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, Rosario y Constitución).

Sobre un total de 10 los lotes monitoreados, uno se encontraba cosechado al momento del relevamiento, en tanto que de los 9 restantes, el 98% presentaba estado muy bueno y bueno y 11% en estado regular.

El 44% se encontró en estado fenológico de inicio de antesis a inicio de amarillamiento del capítulo (R5 a R7) y el 56% en madurez fisiológica (R8-R9).

Sólo el 11% de los lotes presentó daño moderado por cotorras, el 89% completamente libre de plagas.

El 100% se encontró sin afectación de daño abiótico enfermedades.

En el 56% de los lotes no se encontraron malezas. En el restante 44% se identificaron Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense*), Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*), Gramón (*Cynodon dactylon*), Rama negra (*Coniza bonariensis*) y Capín arroz (*Echinocloa crussgalli*), todas en presencia leve.

MAÍZ TEMPRANO

MAÍZ TEMPRANO

Región Norte (Departamentos 9 de Julio, General Obligado, San Javier y Vera)

El 40 % de los lotes monitoreados había sido cosechado. Los que continuaban en desarrollo se encontraron en estado bueno y muy bueno y cursando estados reproductivos (R6).

En un 50 % de los lotes se reportó presencia de plagas. Las especies observadas fueron Oruga (*Spodoptera frugiperda*), Isoca de la espiga de maíz (*Helicoverpa zea*) y Chicharrita (Dalbulus maidis).

No se reportaron enfermedades.

Región Centro (Departamentos Castellanos, La Capital, Las Colonias, San Cristóbal, San Jerónimo, San Justo y San Martín).

Del total de lotes monitoreados 4% había sido cosechado y 9% picado.

El 81% de los lotes que continuaban en desarrollo presentaba estado muy bueno y el 17% estado bueno, solo un 2% se reportó en estado regular.

En cuanto al estado vegetativo, el 100% de los lotes estaba cursando estados reproductivos entre R5 y R6.

Se reportaron malezas en el 27% de los lotes, principalmente Yuyo Colorado (*Amaranthus quitensis*), Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense*) y Rama negra.

En un 15 % de los lotes se reportó presencia de plagas. Las especies observadas fueron Oruga cogollera (*Spodoptera frugiperda*), Isoca de la espiga del maíz (*Helicoverpa zea*)

En el 5% de los lotes se observaron signos leves de las enfermedades Tizón del maíz (*Helminthosporium turcicum*) y Bacteriosis (*Pseudomonas alboprecipitans*).

En el 12 % de los lotes se reportaron daños leves por sequía.

Región Sur (Departamentos Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo).

Sobre un total de 51 lotes de maíz temprano monitoreados, el 98% presentaba estado muy bueno y bueno y 2% estado regular.

El 37% se encontró en pleno llenado de grano (R3-R4) y el 67% restante en comienzo de maduración o maduración (R5-R6).

El 84% de los lotes se encontró libre de malezas. En los lotes con malezas se identificaron Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*), Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense*) y Flor de Santa Lucía (*Commelina erecta*) en presencia leve (88%) y Yuyo colorado en poblaciones moderadas (12%).

El 90% de los lotes se encontraron libres de daños por plagas insectiles, mientras que en el 10% se informó presencia leve de Oruga de la espiga del maíz (*Helicoverpa zea*) y cotorras.

El 91% de los lotes no presentó ataque de enfermedades, mientras que en el 9% restante se encontró daño leve por Roya (*Puccinia sorghi*) y tizón del maíz (Helminthosporium turcicum).

El 100% de los lotes se encontraron sin daños abióticos.

MAÍZ TARDÍO

MAÍZ TARDÍO

Región Norte (Departamentos 9 de Julio, General Obligado, San Javier y Vera)
La totalidad de los 14 lotes monitoreados se encontró en estado bueno y muy bueno y en estados vegetativos entre V2 y V8.
En el 14 % de los lotes se observaron malezas, principalmente Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense*) y Cloris (*Chloris virgata*).
En el 63% de los lotes se observaron plagas, principalmente Oruga cogollera (*Spodoptera frugiperda*) y Chicharrita (Dalbulus Dmaidis).
No se reportaron enfermedades ni adversidades abióticas.

Región Centro (Departamentos Castellanos, La Capital, Las Colonias, San Cristóbal, San Jerónimo, San Justo y San Martín).
Sobre 37 lotes monitoreados 65% presentaba estado muy bueno y 35% estado bueno En cuanto al estado vegetativo, el 100% de los lotes estaba cursando estados vegetativos, la mayoría entre V1 y V5.
Se reportaron malezas en el 26% de los lotes, principalmente Yuyo Colorado (*Amaranthus quitensis*). Otras especies presentes fueron Cloris (*Chloris virgata*), Pie de gallina (Eleusine_indica) y Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense*), entre otras.
En el 58% de los lotes se observaron plagas. Las más frecuentes fueron Oruga cogollera (*Spodoptera frugiperda*) y Chicharrita (Dalbulus Dmaidis).
Solo en el 5 % de los lotes se observaron signos de Roya (*Puccinia sorghi*).

Región Sur (Departamentos Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo).
Sobre un total de 19 lotes de maíz de segunda o de fecha tardía el 68% presentaba estado bueno, 16% estado muy bueno y 16% estado regular.
El 47% se encontró en estadios fenológicos de V3 y V4 y el 53% restante entre V5 y V8.
El 68% de los lotes se encontró libre de malezas. En los lotes con maleza se identificaron Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*), Sorgo de alepo (Sorghum alepense), Cloris (*Chloris virgata*), Capín arroz y Echinocloa, todas en presencia leve.
El 68% de los lotes se encontró libre de daños por plagas insectiles, mientras que en el 32% se informó presencia de Oruga cogollera (*Spodoptera frugiperda*): 83% leve y 17% moderada.
No se encontraron enfermedades.
El 53% de los lotes mostró daño por sequía: 60% leve y 40% moderados.

SOJA DE PRIMERA

Norte (Departamentos 9 de Julio, General Obligado, San Javier y Vera)

El 94% de los 24 lotes de soja de primera monitoreados se encontraba en estado bueno y muy bueno. En cuanto al estado fenológico, el 60% cursaba estados reproductivos entre R1 y R4 y el resto cursaba estados vegetativos entre 1 y 8

En el 54 % de los lotes se observaron malezas, principalmente Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense*), Cloris (*Chloris virgata*) y Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*), entre otras.

En el 50% de los lotes se observaron plagas, la más frecuente fue Oruga militar (*Spodoptera frugiperda*) No militar tardía. Otras especies observadas fueron Trips (*Caliothrips phaseoli, Frankliniella schultzei, Thrips* tabaci) Chinche hedionda (*Edessa meditabunda*), Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis*) y Oruga medidora (*Rachiplusia nu*).

No se reportaron enfermedades

Región Centro (Departamentos Castellanos, La Capital, Las Colonias, San Cristóbal, San Jerónimo, San Justo y San Martín).

Sobre un total de 70 lotes de soja monitoreados, el 60% presentaba estado muy bueno yel 40% estado bueno. En cuanto al estado fenológico la mayoría estaban cursando estados reproductivos entre R1 y R5.

Se reportaron malezas en el 31% de los lotes, siendo las especies más frecuente Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense*), Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*) y Cloris (*Chloris virgata*), entre otras.

En el 27% se observaron plagas, las más frecuentes Arañuela roja (*Tetranychus urticae*), Oruga medidora (*Rachiplusia nu*) y Trips (*Caliothrips phaseoli, Frankliniella schultzei, Thrips tabaci*)

En cuanto a enfermedades, el 64% de los lotes mostró signos de Mancha marrón (*Septoria glycines*), Tizón de la hoja y Mancha púrpura (*Cercospora kikuchii*).

En el 13 % de los lotes se reportaron daños moderados por sequía

Región Sur (Departamentos Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo).

Se monitorearon 61 lotes encontrándose el 97% en estado muy bueno y bueno y sólo el 3% en estado regular.

El 23% se encontró en floración (R1-R2), 59% en fructificación (R3-R4) y 18% en inicio de llenado (R5).

El 42% de los lotes observados se encontró libre de malezas. En el 58% restante se encontró Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*), Rama negra (*Conyza bonariensis*), Cloris (*Chloris virgata*)y Sorgo de alepo (*Sorghum halepense*) en cantidad leve (90%) y yuyo colorado en cantidad moderada en el 10% de los lotes.

En el 46% de los lotes monitoreados no se encontraron plagas, mientras que en el 54% restante se halló daño leve por Trips (*Caliothrips phaseoli, Frankliniella sp y Thrips tabacci*), Arañuela roja (*Tetranychus urticae*), Oruga medidora (*Rachiplusia nu*) y complejo de chinches.

Respecto a enfermedades sólo en el 39% de los lotes se encontré, en presencia leve, Mancha marrón (*Septoria glycines*) y Tizón de la hoja y mancha púrpura (*Cercospora kikuchii*).

Sólo 2% de los lotes presentaron daños leves por sequía.

SOJA DE SEGUNDA

Norte (Departamentos 9 de Julio, General Obligado, San Javier y Vera)

De los 11 lotes de soja de segunda monitoreados el 82% presentaba estado bueno y el 18% estado muy bueno. En cuanto al estado fenológico, la mayoría cursaba estados vegetativos entre V1 y V8 y algunos pocos lotes estaban en R1.

En el 27 % de los lotes se observaron malezas, principalmente Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense*), Rama negra (*Coniza borariensis*), Cloris (*Chloris virgata*) y Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*), entre otras

En el 17% de los lotes se observaró presencia de Oruga Medidora (*Rachiplusia nu*), Trips (*Caliothrips phaseoli, Frankliniella schultzei, Thrips tabaci*) y caracoles.

No se reportaron enfermedades.

Región Centro (Departamentos Castellanos, La Capital, Las Colonias, San Cristóbal, San Jerónimo, San Justo y San Martín).

Sobre un total de 59 lotes de soja monitoreados, el 93% presentaba estado muy bueno y bueno y el 7% estado regular. En cuanto al estado fenológico la mayoría se encontraba en estados vegetativos desde V1 a V10 y alrededor de un 25% en estados reproductivos entre R1 y R3.

Se reportaron malezas en el 34% de los lotes, siendo las especies más frecuente Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense*), Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*) y Cloris (*Chloris virgata*), entre otras.

En el 14% de los lotes se encontraron plagas, principalmente Arañuela roja (*Tetranychus urticae*) y Trips (*Caliothrips phaseoli, Frankliniella schultzei, Thrips tabaci*)

En el 14 % se encontraron enfermedades, siendo la más frecuente Mancha marrón (*Septoria glycines*)

Región Sur (Departamentos Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo).

Se monitorearon 46 lotes encontrándose el 9% en estado muy bueno, 67% bueno y 24% en estado regular.

El 50% se encontró en estados vegetativos, principalmente de V5 a V7, y el 50% en estadios reproductivos mayormente en floración (R1-R2), sólo algunos pocos en inicio de fructificación.

El 50% de los lotes observados se encontró libre de malezas. Entre los que presentaron malezas, el 83% presentó en cantidad leve de malezas como Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*), Sorgo de alepo (*Sorghum halepense*), Rama negra (*Conyza bonariensis*) y Cloris (*Chloris virgata*). En el 7% restante se reportaron poblaciones moderadas de Yuyo colorado.

El 50% de los lotes mostró daños por sequía: 43% leve, 43% moderada y 14% intensa.

En el 68% de los lotes monitoreados no se encontraron plagas, mientras que en el 32% restante se reportó presencia de Trips (*Caliothrips phaseoli, Frankliniella sp y Thrips tabacci*). Arañuela roja (*Tetranychus urticae*), Oruga medidora (*Rachiplusia nu*) y Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis*). Un 13% de los lotes con plagas presentó cantidades moderadas y severas de daño por trips.